

# CTC – 20

## Estruturas Discretas para Computação

Prof. Armando Gouveia

# Produto direto

## Definição: produto direto

Sejam  $(G, \circ)$  e  $(H, *)$  grupos.

Definimos a operação  $\cdot$  em  $G \times H$  por

$$(g_1, h_1) \cdot (g_2, h_2) = (g_1 \circ g_2, h_1 * h_2).$$

Então  $(G \times H, \cdot)$  é um grupo

e é chamado “produto direto de  $G$  e  $H$ ”.

## Demonstração

Exercício ☺

## Exemplo

$$\left. \begin{array}{l} G_1 = (\mathbb{Z}, +) \\ G_2 = (\mathbb{R}^*, \cdot) \end{array} \right\} \begin{array}{l} G_1 \times G_2 = \{(a, b) \mid a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{R}^*\} \\ (a_1, b_1) * (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 \cdot b_2) \end{array}$$

$$\text{Veamos: } (3, 4) * (2, 2) = (5, 8)$$

$$\text{elemento neutro} = (0, 1).$$

## Generalizando

Sejam  $G_1, G_2, \dots, G_k$  grupos

com elementos neutros  $e_1, e_2, \dots, e_k$  respectivamente.

O conjunto  $G_1 \times G_2 \times \dots \times G_k$  é um grupo

com a operação binária

$$(a_1, a_2, \dots, a_k) * (b_1, b_2, \dots, b_k) = (a_1 b_1, a_2 b_2, \dots, a_k b_k),$$

onde  $a_i b_i$  representa a operação no grupo  $G_i$ .

O elemento neutro do grupo é  $(e_1, e_2, \dots, e_k)$ .

Os elementos inversos são

$$(a_1, a_2, \dots, a_k)^{-1} = (a_1^{-1}, a_2^{-1}, \dots, a_k^{-1}).$$

Exemplo:  $Z_2 \times Z_3$

Subentendido :  $(Z_2, \oplus) \times (Z_3, \oplus)$

$$Z_2 \times Z_3 = \{(a, b) \mid a \in \{0,1\} \text{ e } b \in \{0,1,2\}\}$$

$$(a_1, b_1) * (a_2, b_2) = ((a_1 + a_2) \bmod 2, (b_1 + b_2) \bmod 3)$$

• Tabelas:

$Z_2$	0	1
0	0	1
1	1	0

$Z_3$	0	1	2
0	0	1	2
1	1	2	0
2	2	0	1

$Z_2 \times Z_3$	(0,0)	(0,1)	(0,2)	(1,0)	(1,1)	(1,2)
(0,0)	(0,0)	(0,1)	(0,2)	(1,0)	(1,1)	(1,2)
(0,1)	(0,1)	(0,2)	(0,0)	(1,1)	(1,2)	(1,0)
(0,2)	(0,2)	(0,0)	(0,1)	(1,2)	(1,0)	(1,1)
(1,0)	(1,0)	(1,1)	(1,2)	(0,0)	(0,1)	(0,2)
(1,1)	(1,1)	(1,2)	(1,0)	(0,1)	(0,2)	(0,0)
(1,2)	(1,2)	(1,0)	(1,1)	(0,2)	(0,0)	(0,1)

- $Z_2 \times Z_3$  é abeliano?

Sim. Pois  $(a, b) * (c, d) = ((a + c) \bmod 2, (b + d) \bmod 3)$   
 $= ((c + a) \bmod 2, (d + b) \bmod 3)$   
 $= (c, d) * (a, b)$

- $Z_2 \times Z_3$  é cíclico?

Procuramos  $a$  tal que  $\langle a \rangle = Z_2 \times Z_3$

ou seja  $(x, y)$  tal que  $\langle (x, y) \rangle = Z_2 \times Z_3$ .

Temos  $\langle (x, y) \rangle = \{ e, (x, y), (x, y)^2, (x, y)^3, (x, y)^4, (x, y)^5 \}$ .

Como encontrar?

Testar um por um... ☹

$$\langle (0,1) \rangle = \{ (0,1), (0,2), (0,0) \}$$

$$\langle (1,1) \rangle = \{ (1,1), (0,2), (1,0), (0,1), (1,2), (0,0) \}$$

Resposta:  $Z_2 \times Z_3$  é cíclico, gerado por  $(1,1)$

e também por  $(1,2)$  e só por eles.

- ordem dos elementos

$o((0,1)) = 3$ , pois  $\langle (0,1) \rangle$  tem 3 elementos (é subgrupo).

$o((1,1)) = 6$ , pois  $\langle (0,1) \rangle = \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3$  tem 6 elementos.

- inversas:

$$(1,1)^{-1} = (1,2)$$

## Outro exemplo

$(\mathbb{R}, +)$  é grupo.

O que é  $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ ?

$$\{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$$

$$(x_1, y_1) * (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$$

Isso se parece com algo conhecido?

Intuitivamente, o produto direto  $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$  é semelhante ao grupo dos números complexos para adição,

$$\text{pois } (a + bi) + (c + di) = (\underbrace{a + c}_{\in \mathbb{R}}) + (\underbrace{b + d}_{\in \mathbb{R}})i$$